



نام و نام خانوادگی :	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۲
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی :	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۳/۰۴	رشته: علوم تجربی
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسرا سر کشور در فوبت خرد داد ماه سال ۱۴۰۱			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده مجاز می باشد)	نمره
------	---	------

۱	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. الف) تابع $f(x) = \sqrt{2x - x^2}$ یک تابع درجه دوم است. ب) تابع $f(x) = x^3$ ، تابعی اکیدا صعودی است. پ) شکل حاصل از دوران یک مستطیل حول طول آن، مخروط نام دارد.	۰/۷۵
۲	درجاهای خالی عبارت ریاضی مناسب قرار دهید. الف) اگر $\{f(3), f(2), f(5)\} = \{1, 2, 3\}$ باشد، حاصل $f^{-1}(f^{-1}(3))$ ..... است. ب) باقیمانده تقسیم عبارت $x^3 - 2x^2 - 5x + 1$ بر $x - 3$ ..... است. پ) خروج از مرکز بیضی با قطر بزرگ ۸ و فاصله کانونی ۶ برابر ..... است.	۰/۷۵
۳	سوالات چهار گزینه ای: I. برد تابع $f$ بازه $[-3, 1]$ است. برد تابع $y = -2f(3x - 1) + 3$ کدامیک از موارد زیر است? الف) $(-8, 0)$ ب) $(-12, 0)$ پ) $(1, 9)$ ت) $(-10, 2)$ II. کدامیک از نقاط زیر روی محیط دایره به معادله $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ قرار دارد? الف) $(0, 0)$ ب) $(1, 0)$ پ) $(0, -1)$ ت) $(-1, 0)$ III. با توجه به نمودار تابع $f$ ، اگر شبی خط مماس در نقاط $a, b, c$ به ترتیب با $m_a, m_b, m_c$ نمایش داده شود. کدامیک از گزینه های زیر صحیح است?  الف) $m_c > m_b > m_a$ ب) $m_a > m_b > m_c$ پ) $m_a = m_b = m_c$ ت) $m_a > m_b > m_c$	۱/۵
۴	اگر ورودی ماشین مقابله باشد، مقدار خروجی آن چقدر است؟ $\text{خروجی} \rightarrow 2x - 2 \rightarrow \frac{x}{\sqrt{x+1}} \rightarrow \text{ورودی}$	۰/۷۵
۵	معادله $y = a \sin(bx + c) + d$ را بنویسید که برد آن $[4, -4]$ و دوره تناوب اصلی آن ۲ است.	۱
۶	معادله مثلثاتی $\sin 2x = \sin x$ را حل کنید.	۱
۷	نمودار تابع $f$ به صورت شکل مقابل است. حدود خواسته شده را محاسبه کنید.  الف) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$ ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =$ پ) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) =$ ت) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) =$	۱


سوالات امتحان نهایی درس : ریاضی ۳	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۲
پایه دوازدهم دوره دوم متوجهه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۳/۰۴	رشته: علوم تجربی
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسراسر کشور در فوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>
سؤالات (پاسخ نامه دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده مجاز می باشد)			ردیف
نمره			

۰/۷۵	$\lim_{x \rightarrow ۳} \frac{x^۳ - ۵x + ۶}{۲x^۳ - ۷x + ۳}$	حد زیر را در صورت وجود محاسبه کنید.	۸
۱	اگر توابع $f$ , $g$ , مشتق پذیر باشند و $g'(۲) = -۶$ , $g(۲) = ۸$ , $f'(۲) = ۵$ , $f(۲) = ۳$ حاصل $(fg)'(۲)$ را به دست آورید.	۹	
۱/۵	$f(x) = \begin{cases} ax+1 & x < ۰ \\ x^۲ + ۳x + ۱ & x \geq ۰ \end{cases}$	اگر مشتق پذیر باشد، مقدار $a$ را محاسبه کنید.	۱۰
۰/۷۵	$f(x) = \sqrt{\frac{۹x - ۲}{x + ۱}}$	مشتق تابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست)	۱۱
۱/۲۵	معادله حرکت متحرکی به صورت $f(t) = t^۳ - t + ۱۰$ بر حسب متر در بازه $[۰, ۵]$ ( $t$ بر حسب ثانیه) داده شده است. سرعت متوسط را در بازه زمانی $[۰, ۵]$ و سرعت لحظه ای را در لحظه $t = ۲$ به دست آورید.	۱۲	
۲	$\frac{۱}{۳}x^۳ - x^۲ - ۳x + \frac{۲}{۳}$ اکسترمم های نسبی تابع $f(x)$ را در صورت وجود به دست آورید.	۱۳	
۱/۵	اگر بین دو عدد حقیقی $x$ و $y$ رابطه $۵x - y = ۱۰$ برقرار باشد، مقادیر $x$ و $y$ را طوری به دست آورید که حاصل ضرب این دو عدد مینیمم گردد.	۱۴	
۱/۵	اگر طول قطر بزرگ $AA'$ و قطر کوچک $BB'$ بیضی مقابل به ترتیب ۱۰ و ۸ باشد: الف) مقدار $A'F$ را به دست آورید. ( $F$ کانون بیضی است) ب) مساحت مثلث هاشور خورده $\triangle BFA'$ چقدر است؟	۱۵	
۱	معادله دایره ای بنویسید که مرکز آن $(۰, ۳)$ و بر خط $۳x - ۴y = ۳$ مماس باشد.	۱۶	
۲	دو ظرف یکسان داریم. ظرف اول شامل ۶ مهره سبز و ۴ مهره آبی و ظرف دوم شامل ۵ مهره سبز و ۷ مهره آبی است. از ظرف اول مهره ای انتخاب کرده و در ظرف دوم قرار می دهیم. سپس یک مهره به تصادف از ظرف دوم انتخاب می کنیم. به چه احتمالی این مهره سبز است؟	۱۷	
۲۰	جمع نمره	"موفق باشید"	

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی ۳	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۳/۰۴			پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) درست صفحات: ۷ و ۱۲۳	+/۷۵ هر مورد ۰/۲۵ پ) نادرست ب) درست
۲	الف) درست صفحات: ۵۰ و ۱۳۱ و ۲۴	+/۷۵ هر مورد ۰/۲۵ $\frac{3}{4}$ پ ب)
۳	صفحات: ۶۹ و ۲۰ و ۱۳۵	۱/۵ هر مورد ۰/۵ III. پ II. ب I. پ
۴	صفحه: ۱۲: $x = ۳ \rightarrow ۲(۳) - ۲ = ۴ \quad (+/۲۵) \rightarrow \frac{۴}{\sqrt{(۴)+۱}} = \frac{۴}{۳} \quad (+/۵)$	+/۷۵
۵	صفحه: ۴۱: به هر کدام از پاسخ‌های یافته شده توسط دانش آموز نمره کامل تعلق گیرد. $ b  = \frac{\pi}{2} = \pi \rightarrow b = \pm\pi \quad (+/۲۵)$ $ a  = \frac{\pi - (-\pi)}{2} = \pi \rightarrow a = \pm\pi \quad (+/۲۵)$ $c = \frac{\pi + (-\pi)}{2} = 0 \quad (+/۲۵)$	۱
۶	صفحه: ۴۷: $\sin ۲x = \sin x \Rightarrow \begin{cases} ۲x = k\pi + x & (+/۲۵) \\ ۲x = k\pi + \pi - x & (+/۲۵) \end{cases} \rightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad (+/۲۵)$	۱
۷	صفحه: ۶۴: الف) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = ۲ \quad (+/۲۵)$ ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = ۰ \quad (+/۲۵)$ پ) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty \quad (+/۲۵)$ ت) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty \quad (+/۲۵)$	۱
۸	صفحه: ۵۳: $\lim_{x \rightarrow ۱} \frac{\overbrace{(x-۱)(x-۲)}^{(+/۲۵)}}{\underbrace{(x-۱)(2x-1)}_{(-/۲۵)}} = \frac{1}{\Delta} \quad (+/۲۵)$	+/۷۵

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی ۳	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس ریاضی ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۳/۰۴			پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>			

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۹	$(fg)'(x) = \overbrace{f'(x)g(x) + f(x)g'(x)}^{(\cdot/\Delta)} = 5 \times 8 + 3(-6) = 22 (\cdot/\Delta)$ صفحه ۸۷:	۱
۱۰	$f' + (\cdot) = 3 (\cdot/\Delta) \rightarrow a = 3 (\cdot/\Delta)$ $f' - (\cdot) = a (\cdot/\Delta)$ تابع $f$ در نقطه $x = 0$ پیوسته است. ( $\cdot/\Delta$ ) صفحه ۹۱:	۱/۵
۱۱	$f'(x) = \frac{\frac{9(x+1)-1(9x-2)}{(x+1)^2} (\cdot/\Delta)}{2 \sqrt{\frac{9x-2}{x+1}} (\cdot/\Delta)}$ صفحه ۸۸:	۰/۷۵
۱۲	$\frac{\Delta f}{\Delta t} = \frac{f(\Delta) - f(\cdot)}{\Delta - \cdot} = \frac{30 - 10}{\Delta - \cdot} = 4 (\cdot/\Delta)$ $f'(t) = 4t - 1 (\cdot/\Delta) \rightarrow f'(2) = 4(2) - 1 = 7 (\cdot/\Delta)$ صفحه ۱۰۰:	۱/۲۵
۱۳	$f'(x) = x^2 - 2x - 3 = + (\cdot/\Delta) \quad x = 3, \quad x = -1 (\cdot/\Delta)$  تمکیل جدول (۱) نمره	۲
۱۴	$p = xy = \Delta x^2 - 10x (\cdot/\Delta) \rightarrow p'(x) = + (\cdot/\Delta) \rightarrow 10x - 10 = + (\cdot/\Delta) \rightarrow \frac{x=1}{y=-5} (\cdot/\Delta)$ صفحه ۱۲۰:	۱/۵

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی ۳	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه			تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۵	<p>(الف)</p> $\begin{aligned} a &= 5 \quad (+/ ۵) \rightarrow c^2 = 25 - 16 \rightarrow c = 3 \quad (+/ ۲۵) \rightarrow A'F = ۸ \quad (+/ ۲۵) \\ b &= 4 \end{aligned}$ <p>(ب)</p> $S_{\Delta} = \frac{1}{2}(5+3) \times 4 = 16 \quad (+/ ۵)$	۱
۱۶	$r = \frac{ 3 \times ۰ - ۴(۳) - ۳ }{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = ۳ \quad (+/ ۵) \Rightarrow (x-۰)^2 + (y-3)^2 = ۹ \quad (+/ ۵)$	۱
۱۷	<p>حل به روش نمودار درختی نمره کامل تعلق گیرد.</p> <p>صفحه: ۱۴۸</p>	۲
	" درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است "	۲۰